



SOURIS ET RATS APPÂTS PÂTES FRAICHES



Habitation, garage,
abris, locaux
professionnels ...



Rodenticide de
dernière génération



Contient un amérisant
pour prévenir l'ingestion
accidentelle par des
espèces non ciblées



Utilisé et recommandé
par les professionnels



Pour la lutte contre la souris,
nous privilégions les appâts
en pâte fraîche



SOLU.FR
TOUTPOURLESNUISIBLES.COM
PENNTYBIO.COM

Traiter juste. protéger mieux

K3D SARL - 04 74 05 25 56
31 allée de la Poste, 42470 Saint Symphorien de Lay
Siret : 499 312 023 | N° agrément : RH02399
info@solu.fr

Nous recommandons l'utilisation d'appâts en pâte fraîche pour la souris, en raison de leur composition plus riche en matières grasses, particulièrement attractive. Les souris sont naturellement attirées par les aliments gras, proches de ceux qu'elles trouvent dans notre environnement domestique.

	Nombre de sachet	Nombre de pâtes fraîches	Sachets d'appât
Appât pâtes fraîches	1	15	1 x 150 g
	2	30	2 x 150 g
	4	60	4 x 150 g

Appât

Nom homologué : FRAP® PAT'
Péremption : 4 ans
AMM N°FR-2012-0500
Composition : Diféthialone 0,0025%
Usage : Rats, Souris.
N°CAS 104653-34-1. Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2), danger pour le milieu aquatique - toxicité chronique (catégorie 3)

Poste d'appâtage

Les postes d'appâtage ne sont pas fournis, mais leur utilisation est obligatoire avec des appâts anticoagulants : ils sécurisent l'appât et réduisent fortement le risque d'ingestion accidentelle par des enfants ou des animaux non ciblés.

Comment lutter efficacement les souris avec les appâts en pâtes fraîches

Les souris peuvent être des nuisibles redoutables pour les maisons et les entreprises. Elles sont non seulement une source de désagrément, mais peuvent également propager des maladies et causer des dommages électrique à votre habitation ou vos locaux. Heureusement, il existe des méthodes efficaces et obligatoire pour contrôler ces rongeurs, notamment l'utilisation de postes d'appâtage et de produits anticoagulants. Ce guide vous fournira les informations nécessaires pour traiter vous-même les souris de manière sûre et efficace.

Comprendre le comportement des souris

Avant de commencer le traitement, il est crucial de comprendre le comportement des souris. Ces rongeurs sont principalement actifs la nuit et peuvent s'introduire dans des ouvertures aussi petites qu'une petite pièce de monnaie. Ils sont attirés par la nourriture, donc éliminer ces sources peut aider à prévenir leur présence. De plus la souris est une grande grignoteuse, il faut donc privilégier plusieurs points d'appâtage.

Remplissage et sécurisation du poste

Ouvrir le poste d'appâtage (non fournis). Placez les appâts à l'intérieur sans trop les tasser. Enlevez la clé et fermez le poste (vous devez entendre un clic).



Emplacement et installation des postes

Installez les postes d'appâtage près des zones où vous avez observé une activité de souris (esquémements, alimentation grignottée, objet ou aliments non à leur place). Placez les postes près des murs, des recoins ou des zones d'activité, car les rongeurs préfèrent se déplacer le long des murs. Veillez à installer les ouvertures par où passe le rongeur contre un mur.

Utilisation

- Faible infestation (visuellement vous constatez un peu de crottes) : de 25 à 50 g de produit espacé de 2 à 3 mètres.
- Forte infestation (visuellement vous constatez la présence sûre de plusieurs individus avec beaucoup de crottes) : de 25 à 50 g de produit espacé de 1 à 1,5 mètres.

Surveillance et usage

En cas de forte infestation, inspectez et réapprovisionnez les boîtes d'appât 3 jours après la 1ère application puis une fois par semaine.

En cas de faible infestation, inspectez et réapprovisionnez les boîtes d'appât une semaine après la 1ère application puis une fois tous les 15 jours. Renouvelez le remplissage des boîtes jusqu'à l'arrêt de la consommation. Remplacez l'appât au besoin.

Si vous remarquez une diminution significative de l'activité des rongeurs ou de la consommation d'appâts, cela peut indiquer une réduction de la population.

La souris rentre dans le poste par une des ouvertures sur le côté de celui-ci. Elle va consommer les appâts sur place et ressortir du poste. À partir de 3 jours, la souris montre des signes de faiblesse et fini par succomber dans son nid.

Délai nécessaire pour l'apparition de l'effet anticoagulant: compris entre 3 et 14 jours (selon l'appât utilisé) après l'ingestion de l'appât. Ce délai est nécessaire pour éviter la méfiance de ses congénères et la non consommation des appâts.

Précautions et sécurité

L'utilisation de produits anticoagulants n'est pas sans risques. Voici quelques précautions à prendre :

- Évitez l'ingestion accidentelle :** Stocker les appâts dans des endroits où les enfants et les animaux domestiques ne peuvent pas les atteindre.
- Utilisez des gants :** Portez toujours des gants lorsque vous manipulez des appâts et des souris mortes pour éviter tout contact avec le poison.
- Consultez des professionnels :** Si vous n'êtes pas sûr de la procédure ou si l'infestation persiste, il peut être judicieux de consulter un professionnel de la lutte antiparasitaire.

La lutte contre souris avec des postes d'appâtage et des produits anticoagulants est une méthode efficace pour contrôler ces nuisibles. En suivant les étapes et les précautions décrites dans ce guide, vous pouvez sécuriser votre maison ou votre entreprise contre les invasions de souris. Cependant, il est toujours préférable de combiner ces méthodes avec une bonne hygiène et des mesures préventives pour obtenir les meilleurs résultats. En effet, nettoyer les zones aux abords et retirer les sources alimentaires.

N'oubliez pas que la gestion des nuisibles peut parfois nécessiter plusieurs approches et réajustements, alors restez vigilant et proactif dans votre lutte contre les souris.